Les modifications corporelles comme forme de comportements auto-dommageables

“Body modifications in borderline personality disorder patients: prevalence rates, link with non-suicidal self-injury, and related psychopathology”

Dr Martin BLAY

Psychiatre

Centre Ambulatoire d'Addictologie et de
Psychiatrie ADDIPSY (Lyon)
Université Claude Bernard Lyon 1

Pauline, 26 ans, entre dans votre cabinet pour une problématique dépressive chronique avec passage à l'acte suicidaire récent. Vous remarquez de nombreux tatouages.

=> Hypothèse diagnostique ?

Contexte

- Modifications corporelles (BM) : « Altération volontaire du corps, souvent pour des raisons artistiques ou esthétiques » (*Wohlrab et al., 2007*)
  - Existent depuis des milliers d'années, mais prévalence a récemment augmentée et la stigmatisation a réduit (*Atkinson, 2003 ; Laumann & Derick, 2006*)
  - Prévalence pouvant aller jusqu'à 51% de piercing dans des échantillons d'étudiants (*Mayers et al., 2002*), et 27.3 % des 25-34 ans tatoués en population générale (*Kluger et al., 2019*).
- Comportements auto-dommageables non suicidaires (NSSI) : « Destruction délibérée et auto-infligée de tissus corporels sans intention suicidaire et à des fins non sanctionnées socialement, et comprend des comportements tels que se couper, se brûler, se mordre et s'arracher la peau » (*Klonsky et al., 2014*)
  - Les NSSI peuvent se produire dans la population générale (*McKenzie & Gross, 2014*)
  - ... mais leur prévalence est plus élevée chez les patients TPL (*Zanarini et al., 2008*)

BM & psychopathologie

- Certaines retrouvent un lien...
  - Estime de soi basse (Kertzman et al., 2019)
  - Impulsivité (Kertzman et al., 2013)
  - Abus de substances (Koch et al., 2010)
  - Comportements suicidaires (Koch et al., 2015)
- D'autres n'en retrouvent pas (*Pajor et al., 2015*)
- Dépend du profil et de l'histoire du patient ? (*Stirn & Hinz, 2008*)
- Lien entre BM & TPL semble intuitif, mais...
  - Pas d'étude sur le taux de prévalence des modifications corporelles chez les patients TPL
  - Très peu d'études sur le lien entre TPL & BM : retrouvent une association significative entre les deux (*D'Ambrosio et al., 2013; Vizgaitis & Lenzenweger, 2019*)
  - Pas d'études sur les spécificités psychopathologiques des patients TPL avec BMs

BM & NSSI

- Pour l'ISSS (International Society for the Study of Self Injury) : *"des comportements tels que la modification du corps, le perçage corporel, le tatouage et l'auto-flagellation religieuse ne sont généralement pas considérés comme des formes d'automutilation"*
- Pour d'autres auteurs : tatouages et piercing peuvent être considérés comme des formes socialement acceptées de NSSI (A. Favazza, 2012)
  - Voire même être utilisées comme un moyen de régulation émotionnelle (Anderson & Sansone, 2003; Matos, 2018; Stirn & Hinz, 2008; Wold & Turk, 2015)
  - Stirn & Hinz (2008) : dans un groupe de volontaires avec BM, parmi les 27% (!) qui rapportaient des NSSI dans l'enfance, certains utilisaient les modifications corporelles comme substitut à leurs comportements auto-agressifs, et certains anciens *self-cutters* attribuaient même une "signification thérapeutique" à leurs BM

Pas de réponse claire...

Objectifs de l'étude

- Quelle prévalence des modifications corporelles dans une population de TPL ?
- Quel lien entre modifications corporelles *et* comportements auto-dommageables chez ces patients ?
- Quels liens entre modifications corporelles *et* psychopathologie (sévérité du trouble, régulation émotionnelle, impulsivité...) chez ces patients ?

Méthodes

- Inclusion
  - > 18 ans
  - BPD+ à la SCID-5-PD
  - Prise en charge au TRE sur la période 2018-2021
- Echelles psychométriques
  - BM & NSSI : Echelles des comportements suicidaires et des lésions corporelles (ECSLS)
  - Régulation émotionnelle : DERS, CERQ
  - Impulsivité : UPPS-P
  - Dépression : BDI
  - Anxiété : STAI

Echelles ESCLS et analyses statistiques

- Auto-questionnaire de 10 items évaluant
  - Histoire et nombre de tentatives de suicides passées
  - Présence et nombre/étendue des modifications corporelles
  - Histoire, nombre et types de NSSIs
- Création de sous-scores
  - Nombre total de piercings ("PercTot") : de 0 (aucun piercing) à 3 (≥ 3 piercings)
  - Surface corporelle couverte par les tatouages ("TatTot") : de 0 (aucun tatouage) à 2 ($>10\%$ du corps tatoué)
  - Score total de modifications corporelles ("BMtot")
- Recherche d'association par régression logistique ordinaire entre
  - PercTot, TatTot, BMtot
  - Histoire de TS, NSSIs, score total de SCID, BSL-23, BDI, STAI, sous-scores adaptatif and non-adaptative de la CERQ, score total de DERS, sous-scores de UPPS

ECHELLE DES COMPORTEMENTS SUICIDAIRES ET LESIONS CORPORELLES

Ce questionnaire porte sur différents comportements que vous auriez pu avoir au cours de votre vie. Il se compose de trois parties portant respectivement sur les comportements suicidaires, les modifications corporelles à but esthétique et les comportements auto-dommageables. Veuillez lire attentivement chaque question et répondre de la manière la plus honnête possible.

A. Comportements suicidaires

1. Avez-vous déjà essayé de mettre fin à vos jours ? NON OUI
2. **Si OUI** : Combien de fois avez-vous essayé de le faire ?
3. Quel âge aviez-vous la 1^{ère} fois que vous avez essayé de mettre fin à vos jours ?
4. Comment avez-vous essayé de mettre fin à vos jours ?
Cochez la méthode utilisée dans la tentative la plus grave (une seule case possible) :
  1. Médicaments
  2. Drogues (par ex, alcool) / Substances (par ex, détergent)
  3. Veinosection / Atteinte corporelle type coupure
  4. Accident de route volontaire
  5. Saut de hauteur
  6. Pendaison
  7. Noyade
  8. Strangulation
  9. Immolation
  10. Arme à feu
  11. Autre : .....

B. Modifications corporelles à but esthétique

5. Vous êtes-vous déjà fait un ou plusieurs tatouages par un professionnel ? NON OUI
6. **Si OUI**, quel pourcentage de votre corps est couvert de tatouage ?
 Moins de 10% entre 10% et 50% entre 50% et 90% plus de 90%
7. Vous êtes-vous déjà fait un ou plusieurs piercings par un professionnel ? NON OUI
8. **Si OUI**, combien de piercings avez-vous ?

C. Comportements auto-dommageables (portant atteinte à l'intégrité corporelle, visant à réduire la détresse intérieure, sans réelle intention de mourir)

9. Vous êtes-vous déjà fait du mal de manière intentionnelle ? NON OUI
10. **Si OUI**, combien de fois avez-vous eu ce genre de comportement ?

	1 fois	1 à 5 fois	5 à 10 fois	>10 fois
1. Avez-vous déjà intentionnellement empêché une blessure de guérir ?				
2. Vous êtes-vous déjà griffé au point de saigner ?				
3. Vous êtes-vous déjà donné des coups de poings ?				
4. Vous êtes-vous déjà tapé la tête ou avez-vous déjà donné des coups de poings ou de pieds contre un mur ou autre une surface solide ?				
5. Vous êtes-vous déjà arraché les cheveux, les poils ou les sourcils ?				
6. Vous êtes-vous déjà mordu au point de laisser une marque sur la peau ?				
7. Vous êtes-vous déjà scarifié le bras, les jambes ou toute autre partie de votre corps ?				
8. Vous êtes-vous déjà brûlé vous-même avec une cigarette, un briquet ou tout autre objet incandescent ?				
9. Vous êtes-vous déjà planté des objets dans le corps (aiguilles, épingles, agrafes etc.) ?				

Résultats

Table 1. Clinical and demographic characteristics of the 116 BPD patients

Variables	N (%)
Gender (female)	91 (78.45%)
Marital status (single or living alone)	66 (56.89%)
Children (without)	85 (73.27%)
Professional activity (without)	42 (36.21%)
Lifetime comorbidities	
Major depressive disorder	63 (54.31%)
Bipolar disorders	9 (7.76%)
Anxiety disorder	62 (53.44%)
Substance use disorders	71 (61.21%)
ADHD	54 (46.55%)
Eating disorders	38 (32.75%)
SBBDM-S	
History of suicide attempt	71 (61.21%)
History of NSSI	101 (87.07%)
Scale	Mean score (SD)*
SBBDMS-S	
Total number of NSSI	13.18 (9.48)
SCID-BDL	6.85 (1.42)
BSL-23	2.04 (0.89)
BDI	33.21 (11.73)
STAI	62.88 (8.50)
DERs – 18 Total score	63.05 (17.45)
CERQ	
Adaptive cognitive regulation strategies	51.92 (13.62)
Non-adaptive cognitive regulation strategies	50.40 (9.73)
UPPS-P	
Negative Urgency	12.84 (2.85)
Positive Urgency	13.08 (2.65)
Lack of Premeditation	9.69 (3.22)
Lack of Perseverance	10.02 (3.21)
Sensation-Seeking	11.34 (3.41)

*Score are given two decimal places

Table 2. PercTot, TatTot and BMTot scores

	Body modifications	N (%)
PercTot score	0	34 (29.31%)
	1	21 (18.10%)
	2	16 (13.79%)
	3	45 (38.79%)
TatTot score	0	35 (30.17%)
	1	55 (47.41%)
	2	26 (22.41%)
BMTot score	0	17 (14.66%)
	1	19 (16.38%)
	2	18 (15.51%)
	3	13 (11.21%)
	4	11 (9.48%)
	5	11 (9.48%)
	>= 6	27 (23.28%)

Associations

- **Association significative entre BMtot & PercTot et...**

- Age
- NSSIs
- Score total de SCID, surtout lié à un effet sur les item 5 “Suicide et comportements autodommageables” et 7 “Sentiment chronique de vide”
- Score total de DERS : tendance non significative pour BMtot, significatif pour PercTot

- **Association significative entre TatTot et...**

- Sous-score “Recherche de sensation” de l’UPPS
- Tendance non significative avec le score total de DERS et les sous-scores “Urgence positive” et “Manque de préméditation” de l’UPPS

Que peut-on en dire ?

Prévalence : *a priori* + fréquent

- **Population générale**

- *Mayers et al., 2002* = 481 étudiants d'un âge moyen de 21 ans, 51% de personnes percées et 23% de personnes tatouées
- *Kluger et al., 2019* = 11 079 personnes représentatives de la population générale, dans le sous groupe 25-34 ans, 27.3 % de personnes tatouées

- **Population Générale vs TPL : pas grand chose...**

- *Höhner et al., 2013* = pas de différences dans la quantité totale et l'étendue des modifications corporelles entre les femmes TPL et non TPL
- *Campo et al., 2007* = différences entre volontaires sains et borderline sur l'échelle des changements d'apparence corporelle (comprenant un item sur les tatouages et un item sur les piercings)

- **Dans notre population TPL**

- 70.69% percés
- 69.83% tatoués

Lien entre BM & NSSIs

- **BMtot, PercTot et NSSIs semblent ainsi être des concepts proches chez les patients TPL**
  - D'autant plus que l'on retrouve une tendance (BMtot) ou une association significative (PercTot) avec la dérégulation émotionnelle
  - Association également avec le nombre de critères SCID pour le TPL
  - A noter l'absence d'association avec l'histoire suicidaire
- **Les patients présentant des BM ont ainsi une tendance à la dérégulation émotionnelle et à recourir à un plus haut nombre de comportements auto-dommageables**
- **Hypothèse : Les piercings et/ou des modifications corporelles en nombre élevé pourraient être utilisées à visée de régulation émotionnelle par certains patients TPL**
  - Sans être pour autant associées à un risque suicidaire augmenté comme les NSSIs peuvent l'être

Quelle place pour les tatouages ?

- **Pas d'association entre TatTot & NSSIs**
  - Mais association avec le sous-score « Recherche de sensation »
- **En population générale**
  - Kertzman et al., 2013 = impulsivité plus élevée chez les femmes tatouées que chez les femmes non-tatouées
  - Roberti et al, 2004 = la recherche de sensation prédit le nombre de tatouages mais pas le nombre de piercings en population estudiantine
- **Hypothèse : un faible nombre de tatouage n'a possiblement pas le même sens clinique qu'un nombre similaire de piercings et/ou qu'un nombre plus élevé de BM**
  - Profil commun : pas plus informatif qu'en population générale ?

Lien avec les symptômes TPL & la psychopathologie générale

- **Association avec les *symptômes* du trouble (SCID), mais pas avec sa sévérité globale (BSL)**
  - Lien avec l'item « Suicide & comportements auto-dommageables » : renforce l'hypothèse d'un lien entre les deux
  - Lien avec l'item « Sentiments chroniques de vide »
    - *Miller et al, 2020* : « déconnexion de soi et des autres personnes »
    - *Linehan, 1993* : Dans le modèle bio-social, le sentiment de vide peut être conceptualisé comme une tentative (consciente ou non) de réduire l'expérience émotionnelle, résultant en un mauvais développement de l'identité personnelle
- **Hypothèse : Relation tripartite entre modifications corporelles, régulation émotionnelle et identité ?**
  - *Vizgaitis & Lenzenweger, 2019* : lien entre BM & BPD features *et* entre BM & trouble de l'identité, et les troubles identitaires médient partiellement le premier lien
  - Pas d'association avec l'item 3 ici

Limites et perspective

- **Limites**

- Echelle non standardisée
- Patients majoritairement des femmes jeunes : quid des sujets âgés et des hommes ?

- **Perspectives**

- Clinique
  - Inclure dans la psychoéducation le lien entre BM, NSSIs, régulation émotionnelle et sentiment chronique de vide ?
  - Pertinent en période de crise : BM « symptomatiques » *ou* BM « classiques »?
- Recherche
  - Quelle signification de la *localisation* de la BM ?
  - Quelle signification interpersonnelle de la BM : Appartenance à un groupe ? Expression émotionnelle ?

Merci de votre attention

En cas de question : martin.blay5@gmail.com